

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO OFICIAL DE PARAIPABA

1) Recursos de Português Nível Superior [Todos de Nível Superior]

Nº da Questão	Recurso	Parecer
04	Candidato(a) Alega que questão deva ser nula por não se enquadrar dentro do conteúdo programático.	DEFERIDO: Por não constar no conteúdo programático, a questão deverá ser nula .
05	Candidato(a) Alega que questão deva ser nula por não se enquadrar dentro do conteúdo programático.	DEFERIDO: Por não constar no conteúdo programático, a questão deverá ser nula .

2) Recursos de Conhecimentos Específicos Enfermeiro

Nº da Questão	Recurso	Parecer
12	Candidato(a) Alega que alternativa correta seja "B" e não "D" como consta o Gabarito Oficial.	INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa correta a ser marcada continua sendo a letra D. De acordo com Cadernos de Atenção Básica. VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose. Série A. Normas e Manuais Técnicos Cadernos de Atenção Básica - n.º 21. Ministério da Saúde. Pág. 66. Está descrito: Período de Incubação. Devido ao padrão de multiplicação do bacilo, a doença progride lentamente. Entre o contato com a pessoa doente e o aparecimento dos primeiros sinais pode levar em média 2 a 5 anos.
17	Candidato(a) Alega que alternativa correta seja "C".	INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa correta a ser marcada continua sendo a letra A. De acordo com Cadernos de Atenção Básica. Hipertensão Arterial Sistêmica. Série A. Normas e Manuais Técnicos Cadernos de Atenção Básica - n.º 15. Ministério da Saúde. Pág. 16 e 17. Está descrito que os dados relevantes do exame físico dirigido ao paciente hipertenso, dentre outros, estão: Exame do abdome: massa abdominais indicativas de rins policísticos, hidronefrose, tumores e aneurismas. Identificação de sopros abdominais na aorta e nas artérias renais; Exame do precórdio: ictus sugestivo de hipertrofia ou dilatação do ventrículo esquerdo: arritmias; 3ª bulha, que sinaliza disfunção sistólica do ventrículo

		esquerdo; ou 4ª bulha, que sinaliza presença de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, hiperfonese de 2ª bulha em foco aórtico, além de sopros nos focos mitral e aórtico. E Exame de fundo do olho: identificar estreitamento arteriolar, cruzamentos arteriovenosos patológicos, hemorragias, exsudatos e papiledema.
--	--	---

3) Recursos de Conhecimentos Específicos Fisioterapeuta [Paraipaba]

Nº da Questão	Recurso	Parecer
11	Candidato(a) Alega que alternativa correta seja "D" e não "A" como consta o Gabarito Oficial.	DEFERIDO: Devido ausência de resposta correta a questão deverá ser anulada .
26	Candidato(a) Alega que questão deva ser nula por não se enquadrar dentro do conteúdo programático e por possuir mais de uma alternativa correta.	INDEFERIDO: O aumento da oxigenação é uma consequência dos exercícios respiratórios segmentares. Dessa forma, a questão deveria ser analisada com cautela, pois os exercícios respiratórios, em sua maioria, têm como consequências o aumento da oxigenação! Por esse motivo, PARA EVITAR CONFUSÃO, todas as outras opções tinham em suas respostas "aumentar a oxigenação" e apenas uma delas, a letra B, que deixava claro o OBJETIVO PRINCIPAL dos exercícios segmentares.